

Nombre del indicador	Lesiones por pólvora en Bogotá D.C.
Definición del evento	Son las lesiones relacionadas con la fabricación, el almacenamiento, el transporte, la comercialización, la manipulación y el uso inadecuado de la pólvora pirotécnica. Se pueden presentar también intoxicaciones por la ingesta de artefactos pirotécnicos que contengan fósforo blanco, especialmente en niños menores de dos años. A partir del 2010 se realiza a nivel nacional, la vigilancia intensificada de estos eventos, desde el primero de diciembre de cada año hasta la segunda semana de enero del año siguiente.
Definición del indicador	El indicador muestra los resultados de la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora en el Distrito Capital.
Utilidad	Captar oportunamente todos los casos mayor de lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco que ocurran durante diciembre y las dos primeras semanas de enero de todos años, con el objetivo de establecer el comportamiento de los eventos en tiempo real y promover las medidas necesarias para su control.
Fórmula de cálculo	Número de casos de lesionados por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco de acuerdo con el área de ocurrencia.
Unidad de medición	Número absoluto
Periodicidad	Anual y diario en la temporada de seguimiento del primero de diciembre de cada año hasta la segunda semana de enero del año siguiente.
Meta	NA
Fuente de información	SIVELCE – Vigilancia intensificada de lesiones por pólvora. Temporadas 2010-2011 a 2018-2019
Responsable	SALUDATABOGOTA - Observatorio de Salud / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co/ Secretaría Distrital de Salud

Fuente: Elaboración propia SALUDATABOGOTA - Observatorio de Salud adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015