



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

DESPACHO DEL SECRETARIO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  
Código: SDS-PGE-FT-021 V.2

Elaborado por:  
Nancy Chacón, Iván Lara  
Revisado por:  
Natalia Rodríguez  
Julián Orjuela  
Aprobado por:  
Alejandro Gómez López



# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

## Tasa de mortalidad perinatal en Bogotá D.C.

### Definición del evento

La muerte perinatal ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso fetal, hasta los siete días después del nacimiento. Una muerte perinatal es el resultado final de la interacción de una serie de factores presentes en el proceso de gestación. El componente social se destaca entre ellos, específicamente en lo relacionado con el acceso económico, educativo, legal o familiar de la madre, así como la oportunidad y eficiencia de los servicios de salud (1).

1. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública Mortalidad perinatal, y neonatal tardía [Internet]. [citado 05 de octubre de 2021]. Disponible en: [https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro\\_Mortalidad%20perinatal%20y%20neonatal%20tardia.pdf](https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Mortalidad%20perinatal%20y%20neonatal%20tardia.pdf)

### Utilidad

Monitorar la magnitud y distribución de la mortalidad perinatal, refleja directamente la atención prenatal, intraparto y neonatal y por lo tanto sirve como demarcador de la calidad del servicio de salud materno-infantil.

### Forma de cálculo

Número de casos de muerte perinatal en un periodo de tiempo / total de nacidos vivos + muertes fetales en el mismo periodo de tiempo \* 1.000

### Unidad de medición

Tasa por 1.000

### Meta

Proyecto de inversión 7829: Nuevas generaciones Salud e Inclusión

- META 2: "A 2024 reducir en un 10% la tasa de mortalidad perinatal por 1.000 Nacidos Vivos (NV) más muertes fetales (MF)". (Junto a los objetivos ODS)
- "Para el 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de los niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada mil nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada mil nacidos vivos (Objetivos Desarrollo Sostenible - Objetivo 3).
- "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades (Objetivos Desarrollo Sostenible - Objetivo 3)."

### Periodicidad de la actualización

Anual

### Fuente de información

Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF\_ND –  
2020: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF\_ND, datos PRELIMINARES-(corte 09-01-2021)-ajustada 18-01- 2021  
2021: Base de datos SDS- RUAF\_ND, datos PRELIMINARES .Corte 12-07-201- Ajustado 21-07-2021

### Serie disponible

2010 – 2021 junio

### Limitaciones del indicador

Ninguno

### Responsable

SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá  
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
Secretaría Distrital de Salud

### Observaciones

Recuerda que el dato correspondiente al 2020 es preliminar, y el 2021 incluye únicamente el primer semestre del año y es preliminar. Se cuidadoso con el análisis e interpretación.