

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Tasa de notificación de VIH / SIDA en Bogotá D.C.

Definición del evento

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. Este, puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Así mismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

Utilidad

Conocer el comportamiento de la epidemia en el Distrito Capital.

Meta

A 2027 el 92% de las personas que conviven con VIH y conocen su diagnóstico, un 92% que acceden al tratamiento y un 92% que alcanzan la carga viral indetectable.

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles (Objetivos de desarrollo sostenible, Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades).

Forma de cálculo

Número de Casos confirmados de VIH/SIDA por 100.000 habitantes del Distrito.

Unidad de medición

Tasa por cada 100.000 habitantes

Periodicidad de la actualización

Semestral

Fuente de información

Numerador:

- Sistema de información SIVIGILA, evento 850

Denominador:

- Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.

Serie disponible

2019 - 2025 junio

Responsable

Alexandra Segura Rodríguez
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
 observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Martha Patricia Padilla Velasco
 Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Observaciones

Ninguna.

1. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.int/topics/hiv_aids/es/

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			
	Código:	SDS-PGE-FT-021	Versión:	
Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez				

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA en Bogotá D.C.

Definición del evento

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. Este, puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Así mismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.

Utilidad

Conocer el comportamiento de la epidemia por VIH en el Distrito Capital.

Meta

A 2027 el 92% de las personas que conviven con VIH y conocen su diagnóstico, un 92% que acceden al tratamiento y un 92% que alcanzan la carga viral indetectable.

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles (Objetivos de desarrollo sostenible, Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades).

Forma de cálculo

Número de defunciones asociadas a VIH/SIDA por cada 100.000 habitantes residentes en Bogotá D.C.

Unidad de medición

Tasa por cada 100.000 habitantes

Periodicidad de la actualización

Semestral

Fuente de información

Numerador:

- Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND. 2019-2023 finales, 2024 preliminar, 2025 preliminar y parcial.

Denominador:

- Proyecciones de Población por Localidad Convenio interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y SDP con base en CNPV DANE 2018.

Serie disponible

2019 – 2025 junio

Responsable

Alexandra Segura Rodríguez
 SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá
 observatoriodesalud@saludcapital.gov.co

Martha Patricia Padilla Velasco
 Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Observaciones

Ninguna.

1. Organización Mundial de la Salud. Disponible en:
https://www.who.int/topics/hiv_aids/es/