

INFORME DE CIRCULACIÓN VIRAL

A la semana epidemiológica 16 de 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD



Alcaldesa Mayor de Bogotá
Claudia Nayibe López Hernández

Secretario Distrital de Salud
Alejandro Gómez López

Subsecretario de Salud Pública
Manuel Alfredo González Mayorga

Coordinación general del documento

Directora de Epidemiología, Análisis y Gestión de
Políticas de Salud Colectiva
Diane Moyano Romero

Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública
Sol Yiber Beltran Aguilera

Autor

Laboratorio de Salud Pública
Sandra Liliana Gómez Bautista
Paula Andrea Borda Osuna

Coordinación Editorial

Oficina Asesora de Comunicaciones en Salud
María Juliana Silva Amado

Corrección de estilo
José Aldemar Garzón González

Diseño y diagramación
Harol Giovanny León Niampira

Fotografía portada
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 # 12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2023
www.saludcapital.gov.co


Vigilancia de virus respiratorios y tosferina semana epidemiológica 16 de 2023. Bogotá D. C.

1. Virus respiratorios

Durante 2023, el Laboratorio de Salud Pública (LSP) continúa apoyando la vigilancia de la infección respiratoria aguda en Bogotá, mediante el procesamiento de muestras remitidas por instituciones centinela de los eventos: Enfermedad Similar a Influenza (ESI) que son pacientes ambulatorios, de pacientes hospitalizados por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y de IRAG inusitado que se presente en cualquier institución de la ciudad.

Las muestras previamente son procesadas por RT-PCR para SARS-CoV-2 y después continúan su análisis con: inmunofluorescencia y reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para el diagnóstico de los principales agentes a los que se les atribuye el IRAG. Para esta semana, por grupo de edad, el 69.6 % de pacientes positivos para virus respiratorios diferentes al SARS-CoV-2 en 2023 corresponden a la población de menores de 5 años (figura 1) y si se incluye al SARS-CoV-2 los menores corresponden al 32.9 % (figura 2).


Figura 1. Distribución porcentual de virus respiratorios por grupo de edad, Laboratorio de Salud Pública Bogotá



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE16 de 2023.

En la figura 1 se presenta el consolidado de los virus respiratorios por los diferentes grupos de edad, en los niños menores de 2 años las mayores frecuencias son de casos de virus de rinovirus (34 %), virus sincitial respiratorio (VSR) (26 %) y adenovirus (14 %), para los niños entre 2 y 4 años se presentan casos de rinovirus (26 %), VSR (20 %), parainfluenza (12 %) e influenza B (11 %).

Figura 2. Distribución porcentual de virus respiratorios y SARS-CoV-2 por grupo de edad, Laboratorio de Salud Pública, Bogotá




Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE16 de 2023.


Al incluir el virus de SARS-CoV-2 en la cuenta de los virus respiratorios, se observa que, en los menores de 2 años las frecuencias son para el rinovirus (27 %), seguido de SARS-CoV-22 (20 %), y el VSR (21 %). En el grupo de 2 a 4 años rinovirus (24 %), VSR (19 %), parainfluenza (11 %) e Influenza B (10 %); y SARS-CoV-2 (8 %). A continuación, se presenta la circulación acumulada de los virus respiratorios de forma desagregada por tipo de vigilancia según grupo de edad figura 3. También se ha incluido al SARS-CoV-2.

Figura 3. Circulación de virus respiratorios por tipo de vigilancia y según grupo de edad, Laboratorio de Salud Pública


Distribución de virus respiratorios en casos de ESI, según grupos de edad. Bogotá



Distribución de virus respiratorios en casos de IRA Grave, según grupos de edad. Bogotá



Distribución de virus respiratorios en casos de IRAG Inusitado, según grupos de edad. Bogotá




Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023

En la figura 4 se puede observar el comportamiento de los virus identificados tanto por la vigilancia centinela como por la vigilancia del IRAG inusitado, mediante las dos metodologías: inmunofluorescencia y RT-PCR.

En la semana transcurrida de 2023 se aprecia la positividad para cualquier virus respiratorio, diferentes al SARS-CoV-2, en la siguiente tabla

Figura 4. Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, Laboratorio de Salud Pública



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE16 de 2023.

Tabla 1. Positividad de virus respiratorios por semana epidemiológica, Bogotá 2023


SE	% Positivos
1	50,5%
2	30,3%
3	45,2%
4	47,5%
5	39,4%
6	18,5%
7	40,3%
8	42,8%
9	34,0%
10	34,0%
11	46,6%
12	34,9%

SE	% Positivos
13	37,7%
14	34,1%
15	43,0%
16	30,4%

Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE16 de 2023.


Dentro de la circulación viral predominan los rinovirus (32 %), VSR (18 %), influenza B (14 %) y adenovirus y parainfluenza (9 %) respectivamente cada uno en las 2.350 muestras analizadas (figura 5).

Figura 5. Proporción acumulada de los virus respiratorios, Laboratorio de Salud Pública



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE16 de 2023.

En cuanto al comportamiento de los virus de influenza, como de costumbre en las primeras semanas del año ha circulado el virus de Influenza B, también para esta semana el virus de Influenza A(H1N1) pdm09.

Figura 6. Distribución de tipos y subtipos de Influenza, Laboratorio de Salud Pública

Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE16 de 2023.


2. Tosferina

El Laboratorio de Salud Pública también apoya la vigilancia de tosferina, con el análisis de todos los casos probables que se presenten en la ciudad. El análisis de la muestra se realiza mediante PCR Multiplex, que en tiempo real detecta *Bordetella pertussis*, *Bordetella parapertussis* y *Bordetella holmesii*.

Se ha observado la siguiente positividad: SE 1 (0,0 %), SE 2 (0,0 %), SE 3 (0,0 %), SE4 (0,0 %) y SE5 (0,0 %), SE6 (0,0 %), SE7 (0,0 %), SE8 (0,0 %), SE9 (0,0 %), SE10 (0,0 %), SE11 (0,0 %), SE12 (0,0 %), SE13 (0,0 %), SE14 (0,0 %), SE15 (0,0 %) y SE16 (0,0 %), en 203 muestras analizadas como se aprecia en la figura 7.


El comportamiento de la tosferina por grupo de edad indica que el 31,5 % de las muestras recibidas pertenecen al grupo de menores de un mes, seguido del grupo de niños de 2 a 3, con el 29,1 % (figura 8).

Figura 7. Comportamiento de la positividad de tosferina en las muestras recibidas por el Laboratorio de Salud Pública 2023



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023


Figura 8. Distribución porcentual de casos de tosferina confirmados en el Laboratorio de Salud Pública por grupo de edad



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023

Con respecto al género, se observa que el 54.2 % de los casos corresponden al género masculino (figura 9).

Figura 9. Distribución porcentual de casos de tosferina confirmados en el Laboratorio de Salud Pública según género



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE16 de 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

