



A la semana epidemiológica 22 de 2022

INFORME DE CIRCULACIÓN VIRAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD



Alcaldesa Mayor de Bogotá
Claudia Nayibe López Hernández

Secretario Distrital de Salud
Alejandro Gómez López

Subsecretario de Salud Pública
Manuel Alfredo González Mayorga

Coordinación general del documento

Directora de Epidemiología, Análisis y Gestión de
Políticas de Salud Colectiva
Diane Moyano Romero

Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública
Sol Yiber Beltran Aguilera

Autor

Laboratorio de Salud Pública
Sandra Liliana Gómez Bautista
Paula Andrea Borda Osuna

Coordinación Editorial

Oficina Asesora de Comunicaciones en Salud
María Juliana Silva Amado

Corrección de estilo
José Aldemar Garzón González

Diseño y diagramación
Harol Giovanny León Niampira

Fotografía portada
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud
Carrera 32 # 12-81
Conmutador: 364 9090
Bogotá, D. C. - 2022
www.saludcapital.gov.co

Vigilancia de virus respiratorios y tosferina a la semana epidemiológica 22 de 2022 en Bogotá D. C


1. Virus respiratorios

Durante 2022, el Laboratorio de Salud Pública (LSP) continúa apoyando la vigilancia de la infección respiratoria aguda en Bogotá, mediante el procesamiento de muestras remitidas por instituciones centinela de los eventos: Enfermedad Similar a Influenza (ESI) que son pacientes ambulatorios, de pacientes hospitalizados por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y de IRAG inusitado que se presente en cualquier institución de la ciudad.

Las muestras previamente son procesadas por RT-PCR para SARS-CoV-2 y después continúan su análisis con: inmunofluorescencia y reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para el diagnóstico de los principales agentes a los que se les atribuye el IRAG.

Para esta semana, por grupo de edad, se observa que el 83,2% de pacientes positivos para virus respiratorios diferentes al SARS-CoV-2 en 2022 corresponden a la población de menores de 5 años (figura 1).

Figura 1. Distribución porcentual de virus respiratorios por grupo de edad, Laboratorio de Salud Pública, Bogotá




Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE22 de 2022
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE22 de 2022.


En la figura 1 se presenta el consolidado de los virus respiratorios por los diferentes grupos de edad, en los niños menores de 2 años las mayores frecuencias son de casos de virus VSR (36 %), de Rinovirus (23 %), y de Adenovirus (12 %), para los niños entre 2 y 4 años se presentan casos de VSR (34 %), Rinovirus (20 %) y Adenovirus (13 %).

A continuación, se presenta la circulación acumulada de los virus respiratorios de forma desagregada por tipo de vigilancia según grupo de edad figura 2.


Figura 2. Circulación de virus respiratorios por tipo de vigilancia y según grupo de edad, Laboratorio de Salud Pública



Distribución de virus respiratorios en casos de IRA Grave, según grupos de edad. Bogotá




Distribución de virus respiratorios en casos de IRAG Inusitado, según grupos de edad. Bogotá



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE22 de 2022

En la figura 3 se puede observar el comportamiento de los virus identificados tanto por la vigilancia centinela como por la vigilancia del IRAG inusitado, mediante las dos metodologías: inmunofluorescencia y RT-PCR

Figura 3. Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, Laboratorio de Salud pública



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE22 de 2022
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE22 de 2022.

En las semanas transcurridas de 2022 se aprecia la positividad para cualquier virus respiratorio, diferentes al SARS-CoV-2, en la siguiente tabla.

Tabla 1. Positividad de virus respiratorios por semana epidemiológica, Bogotá 2022

SE	% Positivos
1	44,9 %
2	32,7 %
3	44,7 %
4	31,4 %


SE	% Positivos
5	35,0 %
6	31,4 %
7	18,0 %
8	28,4 %
9	57,6 %
10	63,6 %
11	48,5 %
12	70,2 %
13	34,3 %
14	33,3 %
15	39,1 %
16	60,6 %
17	46,7 %
18	44,0 %
19	75,7 %
20	24,2 %
21	23,3 %
22	11,3 %

Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE22 de 2022
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE22 de 2022.

Dentro de la circulación viral predominan los VSR (28 %), rinovirus (21 %), bocavirus (17 %), adenovirus (11 %), parainfluenza (9 %) y virus de influenza A H3N2 (7 %), en las 4044 muestras analizadas (figura 4).


En cuanto al comportamiento de los virus de Influenza, estos circularon durante las seis primeras semanas del año, siendo el subtipo H3N2 el predominante (figura 5), este mismo subtipo reaparece en la semana 12 con tres casos, y vuelve a mostrarse desde en la semana 17 de forma continua hasta la semana 22 alcanzando una positividad de 3.4 % para esta semana entre todos los virus.

Figura 4. Proporción acumulada de los virus de Influenza y otros virus respiratorios, Laboratorio de Salud pública



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE21 de 2022
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE21 de 2022.

Figura 5. Distribución de tipos y subtipos de Influenza, Laboratorio de Salud pública




Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE22 de 2022
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, Corte SE22 de 2022.

2. Tosferina

El Laboratorio de Salud Pública también apoya la vigilancia de tosferina, con el análisis de todos los casos probables que se presenten en la ciudad. El análisis de la muestra se realiza mediante PCR Multiplex, que en tiempo real detecta *Bordetella pertussis*, *Bordetella parapertussis* y *Bordetella holmesii*.

Figura 6. Comportamiento de la positividad de tosferina en las muestras recibidas por el Laboratorio de Salud Pública, 2022




Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE22 de 2022

Se ha observado la siguiente positividad: SE 1 (0,0 %), SE 2 (0,0 %), SE 3 (0,0 %), SE 4 (0,0 %), SE 5 (0,0 %), SE 6 (0,0 %), SE 7 (0,0 %), SE 8 (0,0 %), SE 9 (0,0 %), SE 10 (0,0 %), SE 11 (0,0 %), SE 12 (0,0 %), SE 13 (0,0 %), SE 14 (0,0 %), SE 15 (0,0 %), SE 16 (0,0 %), SE 17 (0,0 %), SE 18 (0,0 %), SE 19 (0,0 %), SE 20 (0,0 %), SE 21 (0,0 %), SE 22 (0,0 %), en 500 muestras analizadas como se aprecia en la figura 6.

El comportamiento de la tosferina por grupo de edad indica que el 27,4 % de las muestras recibidas pertenecen al grupo de niños menores de un mes, seguido del grupo de niños de 2 a 3 meses, con el 32,6 % (figura 7).


Con respecto al género, se observa que el 54,4 % de los casos corresponden al género masculino y el 45,6 % al género femenino (figura 8).

Figura 7. Distribución porcentual de casos de tosferina confirmados en el Laboratorio de Salud pública por grupo de edad



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE22 de 2022

Figura 8. Distribución porcentual de casos de tosferina confirmados en el Laboratorio de Salud pública según género



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE22 de 2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

