INFORME DE CIRCULACION VIRAL EN BOGOTÁ D.C.

A la semana epidemiológica 17 de 2024



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

BOGOTÁ

Vigilancia de virus respiratorios y tosferina semana epidemiológica 17 de 2024.

Bogotá D.C

1. Virus respiratorios

Durante 2024, el Laboratorio de Salud Pública (LSP) continúa apoyando la vigilancia de la infección respiratoria aguda en Bogotá, mediante el procesamiento de muestras remitidas por instituciones centinela de los eventos: Enfermedad Similar a Influenza (ESI) que son pacientes ambulatorios, de pacientes hospitalizados por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y de IRAG inusitado que se presente en cualquier institución de la ciudad.

Las muestras previamente son procesadas por RT-PCR para SARS-CoV-2 y después continúan su análisis con: panel respiratorio Allplex y reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para el diagnóstico de los principales agentes a los que se les atribuye el IRAG.

Para esta semana, por grupo de edad, el 74.1% de pacientes positivos para virus respiratorios diferentes al SARS-CoV-2 en 2024 corresponden a la población de menores de 5 años (figura 1) y si se incluye al SARS-CoV-2 los menores corresponden al 59.4% (figura 2).

Figura 1. Distribución porcentual de virus respiratorios por grupo de edad, LSP Bogotá



	<2 años	2-4	5 a 14 años	15 a 39 años	40 a 59 años	60 y más
H1N1 2009	50	53	48	24	15	30
A no subtipifica						
A no subtipificable	2	7	4	4	4	5
H1N1						
H3N2	7	3	15	21	5	2
Influenza B	3	1	4	2		
Otros Virus (Enterovirus)	15	11	2			1
Bocavirus	37	35	7	3	1	1
Metapneumovirus	55	30	8	2	1	1
Rinovirus	275	113	68	32	14	20
Parainfluenza	75	46	20	7	5	4
VRS	175	69	9	2	3	3
Adenovirus	71	44	10	4		

Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE), y Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE17 de 2024

En la figura 1 se presenta el consolidado de los virus respiratorios por los diferentes grupos de edad, en los niños menores de 2 años las mayores frecuencias son casos de Rinovirus (36%), VSR (23%) y Parainfluenza (10%) cada uno respectivamente, para los niños entre 2 y 4 años se presentan casos de Rinovirus (27%), VSR (17%) y H1N1 2009 (13%).

Figura 2. Distribución porcentual de virus respiratorios y SARS CoV 2 por grupo de edad, LSP Bogotá



	<2 años	2-4	5 a 14 años	15 a 39 años	40 a 59 años	60 y más
SARS CoV 2	146	19	34	164	155	141
H1N1 2009	50	53	48	24	15	30
A no subtipifica						
A no subtipificable	2	7	4	4	4	5
H1N1						
H3N2	7	3	15	21	5	2
Influenza B	3	1	4	2		
Otros Virus (Enterovirus)	15	11	2			1
Bocavirus	37	35	7	3	1	1
Metapneumovirus	55	30	8	2	1	1
Rinovirus	275	113	68	32	14	20
Parainfluenza	75	46	20	7	5	4
VRS	175	69	9	2	3	3
Adenovirus	71	44	10	4		

Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE) y Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE17 de 2024

Al incluir el virus de SARS CoV 2 en la cuenta de los virus respiratorios, se observa que, en los menores de 2 años las frecuencias son para el Rinovirus (30%), VSR (19%) y SARS CoV 2 (16%), en el grupo de 2 a 4 años Rinovirus (26%), VSR (16%) y H1N1 2009 (12%). A continuación, se presenta la circulación acumulada de los virus respiratorios de forma desagregada por tipo de vigilancia según grupo de edad figura 3. También se ha incluido al SARS CoV 2.

Figura 3. Circulación de virus respiratorios por tipo de vigilancia y según grupo de edad, LSP



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE) corte SE17 de 2024

En la figura 4 se puede observar el comportamiento de los virus identificados tanto por la vigilancia centinela como por la vigilancia del IRAG inusitado, mediante las dos metodologías: panel respiratorio Allplex y RT-PCR.

Figura 4. Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por panel respiratorio Allplex y prueba molecular, LSP



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE) y Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE17 de 2024

En las semanas transcurrida de 2024 se aprecia la positividad para cualquier virus respiratorio, diferentes al SARS-CoV-2, en la siguiente tabla

Tabla 1. Positividad de virus respiratorios por semana epidemiológica, Bogotá 2024

SE	% Positividad
1	10,8%
2	12,9%
3	6,8%
4	6,3%
5	6,6%
6	8,4%
7	7,6%
8	8,8%
9	11,8%
10	14,0%
11	11,9%
12	10,2%

13	52,2%
14	55,5%
15	46,1%
16	59,1%
17	36,4%
PORCENTAJE DE POSITIVIDAD ACUMULADO	**13,4%**

Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE) y Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE17 de 2024

Dentro de la circulación viral acumulada predominan los Rinovirus (33%), VSR (16%) y A(H1N1)pdm09 (14%) y en las 1.587 muestras positivas de las 11.825 muestras analizadas (figura 5)

Figura 5 Proporción acumulada de los virus respiratorios, LSP



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE) y Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE17 de 2024

En SE17 la circulación viral estuvo con predominio de VSR (12.1%), Rinovirus (8.7%) y Parainfluenza (4.9%); en las 264 muestras analizadas para esta semana.

Dentro de la circulación viral al incluir el virus de SARS CoV 2 en la distribución de los virus respiratorios, se observa que predominan los SARS Cov2 (29%), Rinovirus (23%) y VSR (12%) de las 2.244 muestras positivas de las 12.355 muestras analizadas (figura 6).

Figura 6 Proporción acumulada de los virus respiratorios con el virus SARS Cov2, LSP



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE) y Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE17 de 2024

En cuanto al comportamiento de los virus de Influenza acumulado a SE16, como de costumbre en las primeras semanas del año ha circulado el virus de Influenza A (2.5%) en 299 muestras positivas, como son el virus de la Influenza A(H1N1) pdm09 (73.6%) e Influenza A(H3) (17.7%).

Figura 7. Distribución de tipos y subtipos de Influenza, LSP



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP Y LABVANTAGE) y Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil corte SE17 de 2024

2. Tosferina

El LSP también apoya la vigilancia de tosferina, con el análisis de todos los casos probables que se presenten en la ciudad. El análisis de la muestra se realiza mediante PCR Multiplex,

que en tiempo real detecta *Bordetella pertussis*, *Bordetella parapertussis* y *Bordetella holmesii*.

Figura 8. Comportamiento de la positividad de tosferina en las muestras recibidas por el Laboratorio de Salud Pública 2024



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (Labvantage), corte SE17 de 2024

Se ha observado la siguiente positividad: SE 1(0,0%), SE2 (0,0%), SE3 (20,0%), SE4 (0,0%), SE5 (0,0%), SE6 (0,0%), SE7 (0,0%), SE8 (0,0%), SE9 (0,0%), SE10 (0,0%), SE11(0,0%), SE12 (0,0%), SE13(0,0), SE14(0,0%), SE15(0,0%), SE16 (0.0%) y SE17 (0,0%) en 135 muestras analizadas como se aprecia en la figura 8.

El comportamiento de la tosferina por grupo de edad indica que el 22,2% de las muestras recibidas pertenecen al grupo de niños de 2 a 3 meses, seguido del grupo de < o = 1 mes con el 21.5%. (figura 9).

Figura 9. Distribución porcentual de casos de tosferina confirmados en el LSP por grupo de edad



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (Labvantage), corte SE17 de 2024

Con respecto al género, se observa que el 53.3% de los casos corresponden al género masculino y el 46.7% al género femenino (figura 10).

Figura 10. Distribución porcentual de casos de tosferina confirmados en el LSP según género



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (Labvantage), corte SE17 de 2024